Red Fitosanitaria de Aragón

Informe sobre la situación fitosanitaria - Semana 27

FRUTALES

Las capturas de la mosca de la fruta se mantienen bajas de manera general. Comienzan a observarse daños en fruto causados por trips y los porcentajes de mosquito verde continúan en niveles bajos.

En los cultivos de pepita las capturas de carpocapsa indican el comienzo de la segunda generación. Los estados predominantes de sila en peral son los de ninfas jóvenes y huevos blancos.

Albaricoquero

Plagas

ANARSIA

Durante la semana 27 el porcentaje de parcelas en las que se ha encontrado presencia de este lepidóptero ha sido del 41,2% con una media de capturas de 15,6 adultos por trampa. No se han registrado daños ni en fruto ni en brote.

CACOECIA

Pese a que no se han observado frutos dañados a causa de esta plaga a lo largo de la pasada semana, se ha encontrado presente en el 80% de las parcelas en las que lo controlan los técnicos de RedFAra en el cultivo del albaricoquero. La media de capturas ha sido de 14 adultos por trampa.

MOSCA DE LA FRUTA

Aunque no se han localizado frutos dañados en aquellos puntos de la Red que se encuentran pendiente de recolección, el porcentaje de parcelas con presencia de este díptero ha sido del 23,5%. La media de capturas en mosquero ha sido de 5 adultos y la de trampas para captura de machos de 2,7.

Ciruelo

Plagas

ANARSIA

Presente en el 50% de las parcelas monitorizadas por la Red, a lo largo de la semana 27 la media de capturas de este lepidóptero en el cultivo del ciruelo ha sido de 12,4 adultos por trampa. No se han encontrado daños ni en brote ni en fruto.

CACOECIA

Durante la pasada semana se ha localizado a esta oruga de la piel en un 60% de los puntos controlados por los técnicos de RedFAra. La media de capturas ha sido de 39,3 adultos por trampa. No se han observado frutos con daños recientes.

Manzano

Plagas

ÁCAROS

Presentes en el 33,3% de las parcelas controladas por los técnicos de RedFAra, durante la semana 27 se ha observado un porcentaje medio de 5,3% hojas ocupadas por formas móviles.

CARPOCAPSA

A lo largo de la pasada semana el porcentaje de parcelas en las que se ha registrado presencia de este lepidóptero ha sido del 52,9% con una media de capturas de 2,4 adultos por trampa. No se han observado frutos con daños recientes. En la tabla siguiente pueden observarse las distintas zonas monitorizadas en las que se han encontrado capturas, las parcelas controladas en cada una de ellas y la media de adultos por trampa y semana:

Zona	Parcelas controladas	Parcelas con presencia	Media de capturas
Bajo Cinca (Confusión sexual)	1	1	3,0
Calatayud	4	2	5,0
Calatayud (Confusión sexual)	2	1	1,0
Cinca Medio-Litera (Confusión sexual)	5	3	1,3
Valdejalón	6	2	3,5
Valdejalón (Confusión sexual)	9	4	2,0

ORUGAS DE LA PIEL

Continúan sin registrarse daños en manzano a causa de estos lepidóperos. Los puntos en los que se monitorizan, así como el número de ellos que registran capturas y la media de estas, pueden observarse en la siguiente tabla:

Especie	Parcelas controladas	Parcelas con presencia	Media de capturas
Adoxophyes orana	8	0	0,0
Cacoecimorpha pronubana	8	8	10,9
Pandemis heparana	8	0	0,0

ZEUZERA

A lo largo de la semana 27 se ha encontrado un 5% de brotes afectados en una parcela localizada en la comarca del Bajo Cinca.

Melocotonero, nectarina…

Plagas

ÁCAROS

Presentes en el 25% de las parcelas controladas por los técnicos de RedFAra, durante la semana 27 se ha observado un porcentaje medio de 3,3% de hojas ocupadas por formas móviles.

ANARSIA

Si observamos la totalidad de las parcelas en las que los técnicos de RedFAra monitorizan esta plaga, se puede observar que durante la semana 27 se ha encontrado presente en un 33,3% de los puntos siendo la media de las capturas de 7,8 adultos por trampa. En la tabla siguiente pueden observarse las distintas zonas monitorizadas, las parcelas controladas, aquellas en la que se han encontrado adultos y la media de las capturas:

Zona	Parcelas controladas	Parcelas con presencia	Media de capturas
Bajo Aragón-Teruel (Confusión sexual)	8	1	2,0
Bajo Aragón-Zaragoza I (Confusión sexual)	10	2	5,0
Bajo Aragón-Zaragoza II (Confusión sexual)	9	2	2,5
Bajo Cinca	9	2	17,7
Bajo Cinca (Confusión sexual)	17	2	5,5

Zona	Parcelas controladas	Parcelas con presencia	Media de capturas
Calatayud	1	1	3,0
Calatayud (Confusión sexual)	1	1	4,0
Cinca Medio-Litera (Confusión sexual)	9	4	1,8
Mequinenza-Torrente	11	3	4,0
Mequinenza-Torrente (Confusión sexual)	5	2	4,0
Valdejalón	22	15	7,5
Valdejalón (Confusión sexual)	15	4	7,0

FRANKLINIELLA

Durante la semana 27 el porcentaje de parcelas controladas por los técnicos de RedFAra en las que se ha encontrado frankliniella ha sido del 61,1%. El porcentaje medio de ocupación ha sido del 5,6% de frutos ocupados.

MOSCA DE LA FRUTA

A lo largo de la pasada semana las trampas y mosqueros de un 16% de las parcelas monitorizadas de este cultivo han presentado capturas siendo la media de estas de 5,0 adultos en el caso de los mosqueros con cebo alimenticio y de 5,8 en el caso de las trampas para captura de machos. No se han encontrado daños causados por este díptero en las parcelas pendientes de recolección.

MOSQUITO VERDE

Este cicadélido se ha encontrado presente en el 81,1% de las parcelas controladas por la Red siendo el porcentaje medio de brotes ocupados del 15,8.

POLILLA ORIENTAL

Estudiando la totalidad de los puntos controlados por los técnicos, esta plaga se ha encontrado presente en un 25,3% de dichos puntos durante la semana 27 siendo el número medio de capturas de adultos en trampa de 5,3. En la tabla siguiente pueden observarse las distintas zonas monitorizadas, las parcelas controladas, aquellas en la que se han encontrado adultos y la media de las capturas:

Zona	Parcelas controladas	Parcelas con presencia	Media de capturas
Bajo Aragón-Teruel (Confusión sexual)	9	1	1,0
Bajo Aragón-Zaragoza I (Confusión sexual)	10	1	1,0

Zona	Parcelas controladas	Parcelas con presencia	Media de capturas
Bajo Aragón-Zaragoza II (Confusión sexual)	9	1	32,0
Bajo Cinca	2	1	3,0
Bajo Cinca (Confusión sexual)	24	4	3,0
Calatayud	2	1	2,0
Cinca Media-Litera	1	1	1,0
Cinca Medio-Litera (Confusión sexual)	10	3	1,0
Mequinenza-Torrente	9	3	7,0
Mequinenza-Torrente (Confusión sexual)	7	2	2,0
Valdejalón	21	9	8,0
Valdejalón (Confusión sexual)	16	4	18,0

Peral

Enfermedades

MANCHA NEGRA

Esta enfermedad que puede presentar síntomas tanto en hojas como en fruto hasta la recolección tan solo ha presentado daños en una parcela situada en la comarca del Cinca Medio con una afección del 6% de hojas afectadas.

SEPTORIA

El porcentaje de las parcelas controladas por los técnicos de RedFAra que presentan síntomas de septoria en hoja durante la semana 27 ha sido de un 46,2% con una media de 16,7% de hojas afectadas. De igual manera, el porcentaje de los puntos monitorizados donde se ha observado daño en fruto ha sido del 38,5% con un porcentaje medio de 10,8% de frutos con afección.

Plagas

CARPOCAPSA

Presente en el 55,6% de las parcelas monitorizadas por la Red, a lo largo de la semana 27 se ha registrado una media de capturas de 3,5 adultos por trampa. No se han encontrado frutos con daños recientes.

ORUGAS DE LA PIEL

A lo largo de la semana 27 no se han registrado daños en peral a causa de estos lepidóperos. Los niveles de los mismos pueden apreciarse en la siguiente tabla, donde se indican las medias de capturas de cada una de las especies controladas:

Especie	Parcelas controladas	Parcelas con presencia	Media de capturas
Adoxophyes orana	4	0	0,0
Cacoecimorpha pronubana	4	4	14,3
Pandemis heparana	4	2	8,0

PULGÓN OSCURO

A lo largo de la semana 27 se ha encontrado presencia de este áfido en un 30% de las parcelas controladas por los técnicos de RedFAra. El porcentaje medio de ocupación es bajo, del 1%.

SILA

Presente en el 100% de las parcelas, a lo largo de la semana 27 el porcentaje medio de ocupación se ha situado en un 28,6%, si bien los porcentajes de ocupación oscilan en gran medida de unas parcelas a otras, encontrando parcelas con un 4,0% y otras con un 100,0%. Los estadios predominantes han sido los de ninfas N1+N2 seguido por huevos blancos. En la siguiente gráfica pueden observarse los distintos porcentajes de cada uno de los estados de la plaga:



Zaragoza, 09 de julio de 2025