



Red Fitosanitaria de Aragón  
**Informe sobre la situación fitosanitaria - Semana 18**

**ABRIL -MAYO de 2024**

**OLIVAR**

**ESTADO FENOLÓGICO**

**Fenología**

Los estados predominantes son **DI** y **DII** aunque hay algunas zonas donde todavía se encuentran en **C** por el efecto de la sequía.



**C** Formación racimo



**DI** Predomina la corola



**DII** La corola cambia de color

**ABICHADO (*Euzophera pingüis*).**

En estas semanas pasadas se han producido los máximos de vuelo en las diferentes comarcas. En plantaciones jóvenes observar si se producen daños, en ese caso realizar tratamiento con productos autorizados ver boletín n.º 3.



Excrementos en tronco



Larva en galería

## **BARRENILLO DEL OLIVO (*Phloeotribus scarabaeoides*)**

Desde mediados de marzo se producen entradas en los troncos cebo, en esta ultima semana las entradas han sido mínimas.


En caso de querer quemar los restos de poda, hay que hacerlo con el perfecto permiso y que el mapa de *índice de riesgo por uso de fuego* lo permita, antes del 31 de mayo. En caso de triturar los resto se puede hacer durante el mes de junio.



*Tronco con entrada de Barrenillo*

## PRAYS (*Prays oleae*).

Ya se han producido los máximos de vuelo de esta generación, en caso de tener que realizar un tratamiento sería en inicio de floración.



## REPILO (*Fusicladium oleagineum*)

En esta primera semana de mayo se ha realizado el control de Repilo de primavera. Los datos obtenidos de los diferentes controles indican que la incidencia de repilo inoculado es elevada, destacando la comarca del Somontano de Barbastro.

Por lo que en parcelas susceptibles (*fondos de valle, hondonadas, así como cerca de cauces de río*) es recomendable realizar un tratamiento con productos sistémicos o curativos antes de floración.



Repilo inoculado