

Antracnosis de las espinacas

Colletotrichum spinaciae



Fotos 1, 2 y 3. Síntomas de antracnosis en hojas de espinaca




Foto 4. Acérvulos

Foto 6. Conidios hialinos y fusiformes

Foto 5. Fructificaciones: acérvulos
con setas largas y negras

espinacas

***Colletotrichum spinaciae* Ellis & Halsted**

Sinónimos. *Colletotrichum dematium* f. sp. *spinaciae*.

Nombre común: Antracnosis de la espinaca.

Biología: Este hongo se desarrolla en condiciones de humedad alta y temperaturas suaves, provocando una mancha verde oscura que rápidamente cambia a parda y muestra un halo húmedo alrededor. Según avanza la lesión se observan unas pequeñas fructificaciones negras llamadas acérvulos que poseen largas setas negras similares a púas donde se forman sus conidios hialinos, fusiformes y ligeramente arqueados.

La semilla infectada es transmisora de la enfermedad pero también puede permanecer sobre restos vegetales.

Daños y medios de control: En condiciones favorables los daños pueden ser cuantiosos.

Para su control se aconseja métodos profilácticos, el empleo de semilla sana y/o su desinfección y cultivares resistentes.

Se pueden emplear tratamientos químicos durante la vegetación con mancozeb, oxiclورو de cobre, captan, tiram, etc.

Se recomienda atender las indicaciones del Boletín Fitosanitario y consultar las materias activas registradas en España, a través de la web del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, (<http://www.marm.es>)

Ficha técnica elaborada por:

Cristina Arribas Fernández

Información actualizada al 16/06/2008

Más información en:

Servicio de Sanidad Vegetal

Tfno: 924 00 20 69

<http://aym.juntaex.es/servicios/boletin/sanidad.vegetal@adr.juntaex.es>

